

# Рекомендації по застосуванню панкреатичних ферментів у дітей різного віку<sup>1,2</sup>



Діти від народження до 18 років<sup>1,2</sup>

## Діти віком 0–1 рік

**2 000–4 000 од. ЄФ ліпази** на 120 мл молочної суміші або грудного молока

## Діти віком < 4 років

**1000 од. ЄФ ліпази** на 1 кг маси тіла при кожному основному прийомі їжі

**500 од. ЄФ ліпази** на 1 кг маси тіла при кожному перекусі

## Діти віком ≥ 4 років

**500 од. ЄФ ліпази** на 1 кг маси тіла при кожному основному прийомі їжі

**250 од. ЄФ ліпази** на 1 кг маси тіла при кожному перекусі

Дослідження, наведені нижче, проводились щодо діючої речовини – панкреатину.

1. Санкарараман С., Шиндлер Т. Екзокринна недостатність підшлункової залози у дітей – виклики лікування. Педіатричне здоров'я, медицина та терапія. 26 жовтня 2023 року; 14:361–378.

2. Струйвенберг М.Р, Мартін С.Р., Фрідман С.Д. Практичний посібник із зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози – розвіємо міфи. БіЕмСі Медікал Едюкейшн. 10 лютого 2017 року; 15 (1):29.

Дозування і тривалість лікування для дітей визначаються лікарем індивідуально